

When To Keep Your Child Home From School

Refer to the daily COVID-19 Screening Tool

Coronavirus Infectious Disease 2019 (COVID-19)

Children with a positive COVID-19 test or displaying symptoms of COVID-19 should stay home until they have had no fever for 24 hours without use of fever-reducing medication AND improvement of symptoms AND at least 10 days have passed since symptoms first appeared. Siblings and household members should also stay home for the recommended length of quarantine.

Chickenpox

Keep child home until they have no new sores for **24 hours AND** all sores are **dried and crusted**.

During an outbreak of chickenpox, children who are **NOT** vaccinated for chickenpox (Varicella) and have been in close contact with someone sick with the infection will not be allowed at school for 21 days after they were last exposed to chickenpox, even if they are not sick.

Diarrhea

Keep child home with two loose or watery stools within **24 hours**, even if there are no other signs of illness. Keep child home until no diarrhea for **24 hours**.

Fever

Keep child home with temperature of **100.4 degrees** or higher. Keep child home until fever-free for **24 hours without** using fever-reducing medicine such as Motrin and Tylenol. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

Flu-like symptoms

Sudden onset of fever, chills, muscle aches; may also have vomiting and diarrhea.

Keep child home until symptom-free for **24 hours**. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

Head lice

Keep child home until treatment is completed and all live lice are gone.

Vomiting

Keep child home until no vomiting for **24 hours**.

Impetigo

Keep child home until **treatment has been started**. **Lesions must be covered while in school**.

MRSA

Keep child home if sore is draining, and cannot be covered with a clean, dry bandage. Keep child home if they cannot keep from picking at sore.

Rash

Keep child home until **seen by a doctor** and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

Strep throat

Keep child home until **24 hours** after the first dose of antibiotics have been started.

Pink eye

Keep child home until **seen by a doctor and until 24 hours** after first dose of medicine, if prescribed.

Ringworm

Keep child home until **seen by a doctor and until treatment has been started**. Area must remain covered at school until completely healed.

Scabies

Keep child home until treatment is completed.

Abdominal Pain

Keep child home with abdominal pain that continues for more than 2 hours.

الأسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة

*** الرجاء الإطلاع على نشرة تعليمات فحص الكوفيد اليومي ***

الأمراض المعدية الناجمة عن فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد -١٩)

يجب على الأطفال الذين بينت نتيجة فحوصاتهم إيجابية فيروس كورونا و ظهرت عليهم أعراض كوفيد- ١٩ البقاء في المنزل إلى أن يثبت اختفاء الحمى لمدة ٢٤ ساعة دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة وتحسن الأعراض و مرور ١٠ أيام على الأقل على ظهور الأعراض لأول مرة. يجب أيضاً على الأشقاء وأفراد الأسرة البقاء في المنزل مدة الحجر الصحي الموصى بها.

الجدري

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة ٢٤ ساعة و إلى أن **تجف جميع القروح و تقشر.** خلال تفشي جدري الماء، لن يسمح للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجدري الماء (فارسيليا) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعدوى بالتواجد في المدرسة لمدة ٢١ يوماً بعد تعرضهم لجدري الماء، حتى لو لم يكونوا مرضى.

الإسهال

إبقاء الطفل المنزل في حال كون البراز طرياً أو سائلاً في غضون 24 ساعة، حتى لو لم يكن هناك أي علامات أخرى من المرض الرجاء إبقاء الطفل في البيت حتى مرور 24 ساعة على زوال أعراض الإسهال.

الحمى:

الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصل إلى درجة ٤.١٠٠ فهرنهايت أو أكثر. إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة واستمرار زوالها لمدة ٢٤ ساعة **دون استعمال** أي أدوية خافضة للحرارة مثل الموترن أو تايلنول. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسلامة عودة الطالب إلى المدرسة.

أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا

ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور بالقشعريرة، آلام في العضلات، من الممكن أيضاً الإصابة بالإسهال والإقياء. يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال العوارض السابقة دون تناول أي دواء. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسلامة عودة الطالب إلى المدرسة.

قمل الرأس

إذا تم اكتشاف القمل للمرة الأولى في المدرسة سوف يسمح للطفل بإكمال اليوم الدراسي لنهايته يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين إتمام المعالجة و زوال جميع الحشرات الحية

الحصف (داء جلدي)

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب. يجب تغطية الأفات أثناء وجوده في المدرسة.

عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمثبيلين

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القروح ملتهبة و متقحة و لا يمكن تغطيتها بلاصقة طبية نظيفة و جافة. يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم يكن بمقدوره التوقف عن حك القروح

الطفح الجلدي

يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب و تلقي العلاج إذا لزم الأمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة

التهاب الحلق

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب.

التهاب باطن العين

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء

القوباء الحلقية مرض جلدي

إبقاء الطفل في المنزل حتى يراه الطبيب وحتى يبدأ العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى نلتئم تماماً.

الجرب

يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العلاج.

الإقياء

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة عليه دون إقياء.

آلام معوية

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بالألم في البطن يستمر لأكثر من ساعتين.